ANIR WS on Mar 14, 2012

Precise measurements of star-formation rates of gamma-ray loud Seyfert AGNs

市川 幸平 (京大), 林田 将明 (京大/Stanford)

舘内 謙(東大), 上田 佳宏 (京大)

Gamma-ray Origins of AGNs

Fermi/LAT ($20\text{MeV} < E < 300\text{GeV}$
All sky survey)

銀河/AGNには(少なくとも)**2種類**の γ 線源があることを発見

Abdo+ (2010)

種類 その1: **Beamed AGNs** (Blazars, radio galaxies)

(γ 線源&機構: 相対論的jet由来の**Inverse Compton**)

種類 その2: **Starburst galaxies**

(γ 線源&機構: ISMと宇宙線の**p-p interaction**)

さらに, Ackermann+ '12 はjet成分を持たない

Seyfert AGNsも γ 線を持つ可能性を示唆

Question

Seyfert AGNの γ 線源は何なのか? (Starburst? or AGN activity?)

Starburst Activities in Seyfert AGN host galaxies

γ/radio相関関係

from starburst galaxies

ESO 323-G077 γ 線detection
NGC 6814 “してるかも”

問題点

radio光度にはAGN成分のコンタミ
の可能性

Starburst Activity (+ AGN?)

より定量的にSeyfert AGN母銀河の星生成量を見積もる方法が必要

Starburst estimator for Seyfert AGNs

Q. より定量的に Seyfert AGN 母銀河の星生成量を見積もるには?

A. Pa α , Pa β , (PAH) が強力な星生成 tracer

mini-TAO/ANIR がベスト!!

(Pa α は現在 mini-TAO の独壇場)

VLT/ISAAC
Gemini/NIR1
UKIRT/UIST

+ H α , H β 情報 (from Kennicutt+ 98, 08 etc..)

-> 星生成率が求まる

星生成率 SFR -> γ 線光度は

Ackermann et al. 2012b を用いる

前期観測RUN: NGC 1068

10/20		Focus	AN2	CN1						AN1 AGN(Ichikawa)	AN3	
10/21		Focus	UT4 (Morokuma)	UT5 (Hanindyo)	UT4 (Morokuma)	Focus	AN1	UT2 (Tanabe)	UT3 (Takahashi)			
UT	23		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pa β : 120s/flame

J band: 60s/flame

100" 9点デザイナーリング

Thank you for the observation!!

List of Targets

'11 (秋) 観測 (1天体)

NGC 1068 (cz=1137 km/s: Pa β O.K.) 観測done.

'12 (春) 観測希望 (4天体)

NGC 4945 (cz=563 km/s: Pa β O.K.)

NGC 6814 (cz=1563 km/s: Pa β O.K.)

ESO 323-G77 (cz=4501 km/s: Pa α / β O.K.)

Circinus Galaxy (cz=434 km/s: Pa α / β O.K.)

List of Targets

Circinus Galaxy 14h13m09.9s -65h20m21s
Sky 要相談
NGC6814 19h42m40.6s -10h19m25s
NGC4945(下図参照)①13h05m55s -49d23m53s
②13h05m39s -49d26m33s
③13h05m23s -49d29m15s
④13h05m07s -49d31m51s
⑤13h04m51s -49d34m35s
Sky 13h04m34s -49d20m00s
ESO323-G77 13h06m26.1s -40d24m52s

優先順位

1. Circinus Galaxy : 434 km/s ($z=0.001448$)
2. NGC6814 : 1563 km/s ($z=0.005214$)
3. NGC4945 : 563 km/s ($z=0.001878$)
4. ESO323-G77 : 4501 km/s ($z=0.015014$)

NGC4945
四角はANIRの視野
番号は座標に対応

観測日時

- ・前半夜 : NGC4945, ESO323-G77, Circinus
- ・後半夜 : NGC6814

フィルター (合計 6.5h)

- ・Circinus Galaxy (3h over-head 含む)
  - N1875(180s, 9dith, S/N>5), H,Ks(60s, 9dith)
  - N1875(180s, 9dith, S/N>5), H,Ks(60s, 9dith) Sky
  - N127 (120s, 9dith, S/N>5), J(30s, 9dith)
  - N127 (120s, 9dith, S/N>5), J(30s, 9dith) Sky
- ・NGC6814 (0.5h over-head 含む)
  - N127(120s, 9dith, S/N>5), J(30s, 9dith)
- ・NGC4945 (1.5h over-head 含む)
  - N127(120s, 5dith, S/N>5), J(30s, 5dith) x 5視野分
  - N127(120s, 5dith), J(30s, 5dith) Sky
- ・ESO323-G77 (1.5h over-head 含む)
  - N191(180s, 9dith, S/N>5), H,Ks(60s, 9dith)
  - N131(120s, 9dith, S/N>5), J(30s, 9dith)

希望コンディション

- ・N191, N1875の場合 PWV < 1 mm が望ましい

今期(12春)は
4天体 (6.5 hr) を希望